



nevera durante una hora.....
ES RIQUISIMO.

Y porque no, una MERMELADA DE NARANJA. Es muy fácil de hacer.

Ingredientes:

- 2 kg. naranjas peladas
- 1 piel de naranja troceada
- 1/2 litro de agua
- 2 kg. de azúcar.

Cortaremos las naranjas en cuatro partes y las pondremos en una olla con el medio litro de agua; coceremos a fuego vivo durante una media hora.

una vez cocida la pasaremos por el pasapuré o batidora y a

esta mezcla añadiremos los dos kg. de azúcar y dejaremos cocer a fuego medio y removiendo muy a menudo, durante una hora.

Una vez fría la pondremos en tarros y tendremos una mermelada para los días de verano.

Es una idea de MAMMA CELIA.



LA FAUNA DE CUEVAS

COMADREJA (MOSTELA)

La comadreja es un pequeño mamífero, no tan abundante como el erizo, que podemos observar en nuestros campos, incluso en las horas más soleadas de los días de verano (a pesar de que caza sobre todo de noche).

DESCRIPCION: tiene un cuerpo ágil y alcanza una longitud máxima de 30 cm., de los cuales de 5 a 8 corresponden a la cola. El hocico es afilado, y las patas son cortas, pero robustas.

Su pelaje tiene un color rojizo en el dorso y en los flancos. El vientre es blanco.

HABITOS Y COMPORTAMIENTO: La comadreja vive en todos los ambientes y se refugia en los árboles huecos, en las cavidades naturales del suelo, en los viejos muros y en los montones de leña y piedras.

Es agilísima, corre y trepa con facilidad, y abandona su madriguera sólo cuando el sol se ha puesto. Es muy atrevida, y la avidez de sangre la impulsa a atacar siempre a sus



víctimas por sorpresa, mordiéndolas en la garganta.

Su alimentación es bastante variada, pero está principalmente constituida por ratones, lagartijas y culebras. Ataca, no obstante, a toda clase de aves, e incluso a las liebres y conejos. Constituye, por lo tanto, una amenaza para la caza. Pero por su escasez y nutrición (se alimenta básicamente de ratones), esta especie debería ser protegida y no combatida.

La comadreja entra en el periodo del celo en marzo. La hembra pare de 5 a 6 crías, que son amamantadas durante largo tiempo.